



BERBERIS X OTTAWENSIS

Fam. Berberidaceae

DESCRIZIONE

Arbusto, vigoroso, con fogliame porpora ma il terreno normale e raggiunge un'altezza massima di 150 cm.

FOGLIE

Rotonde od ovali, rosso porpora scuro imparipennate virano al cremisi in autunno.

FRUTTI

Bacche rosse in autunno.

HABITAT

Originarie dell'Asia, crescono spontaneamente in Europa, Asia, Asia settentrionale e America.

DISTRIBUZIONE

In Italia si utilizzano prevalentemente per formare siepi o bordure, o coltivati come esemplari singoli.

FUSTO

Legnoso, con colore tendente al marrone scuro-grigiastro.

CURIOSITÀ

È un ibrido del crespino di Thunberg (*Berberis thunbergii*) e del crespino comune (*Berberis vulgaris*). *Berberis x ottawensis* è nato a Ottawa (Canada) all'inizio del XX secolo. Le piccole bacche sono commestibili. Il sapore è aspro (a causa della grande concentrazione di acido malico), ma sono ricche di vitamina C e spesso utilizzate per la produzione di liquori, marmellate, confetture e sciroppi, ovvero per la preparazione di piatti a base di carne (tradizione culinaria russa e iraniana). Il nome del genere deriva dal greco Berberi, "Conchiglia", proprio per la forma particolare dei petali dei fiori.

FIORI

Si presentano in grappoli ascellari, è color giallo-oro; il suo periodo di fioritura è Aprile – Giugno.

RADICI

Apparato radicale molto sviluppato, con grandi radici di colore scuro.

